Гадюка обыкновенная (Vipera berus) достигает в длину 100 см, много вариаций окраски. Новорожденные гадюки размером 15-20 см уже ядовиты. Встречается на севере и западе области. Окраска змеи варьирует в широких пределах от серого до бурого, обычно с зигзагообразным рисунком




Уж обыкновенный: Внешне обыкновенные ужи обычно легко отличаются от других змей «жёлтыми ушами» — ярко выраженными отметинами на голове, чаще жёлтыми, но иногда белыми и оранжевыми. В редких случаях отметины могут быть слабо выражены или отсутствуют. Не ядовит.



Гадюка Никольского (Vipera nikolskii) – её ещё называют «черной» гадюкой из-за интенсивного черного окраса (рис. 10 И). Достигает в длину 85 см. Ядовита.





Обыкновенный щитомордник:Самый распространённый вид ядовитых змей.

Не нападают первыми!





Большинство летальных исходов от неправильно оказанной помощи!





Клещ : Длина клещей обычно составляет 0,2—0,4 мм. Туловище цельное или разделено на две части, которые не соответствуют головогруди и брюшку пауков, — граница проходит несколько ближе к передней части тела. Обычно имеется 6 пар придатков, из которых 4 задних пары у большинства взрослых особей — ноги (личинки, как правило, шестиногие).


Алгоритм удаления клеща

1:Захватить головку паразита как можно ближе к коже. Хорошо, если у человека или помощника длинные ногти — ими можно ухватиться именно под раздутым тельцем клеща.

2. Медленно и аккуратно шевелить клеща из стороны в сторону, несильно потягивая вверх от кожи. Резкие движения здесь недопустимы, поскольку при этом можно случайно оторвать тело клеща от головы, а вынуть головку из кожи после этого будет значительно сложнее.

3. Как только клеща удалось вынуть из ранки, его нужно положить на салфетку (он уже не представляет опасности), найти хорошо закрывающуюся емкость (бутылку, спичечный коробок, пакет) и положить туда;

4:Незамедлительно обратиться к врачу



Каракурт: Размер тела самка 10—20 мм, самец 4—7 мм· Тело чёрное, у самца и самки на брюшке красные пятна, иногда с белым окаймлением вокруг каждого пятна.

Необходимо прижигание укушенного места воспламеняющейся головкой спички, но обязательно не позднее двух минут после укуса. От нагревания не успевший всосаться яд разрушается, так как паук прокусывает кожу своими хелицерами на глубину всего 0,5 мм. В любом случае необходимо обеспечить оказание медицинской помощи.

МАОУ «Классический лицей №1» предупреждает : Осторожно опасные обитатели Ростовской области!

Автор: Мастафа Ю.В.

Ростов-на –Дону

2018 г